

STERILIZATION

Dr.lashtoo Aghaee

فاکتورهای موثر بر کفایت ضد عفونی کنندگی

- غلظت
- زمان
- **PH**
- دما
- ماهیت ارگانیسم
- حضور ترکیبات خارجی (سرم، خون...)
- تماس
- محیط کشت

ارزیابی ضدعفونی کننده ها

- ارزیابی بر اساس تعیین بالاترین رقت یک ماده شیمیایی (**Germicide**) که ارگانیسم مورد آزمایش را در یک زمان معین می کشد، صورت می گیرد.
- به بالاترین رقت فنل که نتیجه مشابه را داشته باشد نیز ضریب فنلی گفته می شود.
- سویه های مورد آزمایش:
 - ✓ سویه های استافیلوکوکوس اورئوس
 - ✓ سالمونلا تایفی، سالمونلا کلر اسوئیس (مهمترین)
 - ✓ سودوموناس آئروژینوزا

مکانیسم عوامل ضد میکروبی

مکانیسم عمل	عوامل ضد میکروبی	مکانیسم عوامل ضد میکروبی
ایجاد شکاف در یک یا دو رشته DNA ایجاد دایمر پیریمیدین	پرتوهای یونیزان پرتوهای غیر یونیزان (ماورا بنفش)	آسیب به DNA
از هم پاشیدگی ساختمان سوم پروتئین ها	اسیدها، بازها، الکل ها، استن و فنل	دنا توره شدن پروتئین ها
متلاشی کردن ساختار غشا، تخریب ساختار لیپوپروتئینی غشا، تخریب دیواره سلولی، کاهش کشش سطحی	الکل ها، حلال های آلی، دترجنت ها، صابون ها، ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم، و ترکیبات فنلی	آسیب به غشا دیواره سلولی
ترکیب با گروه های سولفیدریل، ایجاد پیوندهای دی سولفیدی بین گروه های سولفیدی مجاور و اختلال در متابولیسم	فلزات سنگین (جیوه، نقره، آرسنیک)، هالوژن ها، پراکسید هیدروژن (اکسید کننده ها)	برداشت گروه های سولفیدریل
اتصال به یک آنزیم، جابجایی سوبسترای طبیعی و ممانعت از بروز واکنش . مونوکسید کربن و دی نیترو فنل در فسفریلاسیون اکسیداتیو تداخل می کنند.	مونوکسید کربن، سیانید، دی نیترو فنل، ۵ متیل تریپتوفان، پارافنیل آلانین	آنتاگونیسم شیمیایی (تداخل در واکنش طبیعی بین آنزیم خاص و سوبسترای آن)

کنترل عملکرد عوامل ضد میکروبی

✓ اسپور باسیلوس پومیلوس جهت کنترل عملکرد پرتوها

✓ باسیلوس استئاروترموفیلوس برای کنترل عملکرد اتوکلاو، چسب های کاغذی، TST(Time, steam, Temperature)

✓ کنترل کار فور بوسیله باسیلوس سوبتیلیس

دسته بندی عوامل شیمیایی موثر بر باکتری ها

- ۱- دترجنت ها (آنیونی (کولیک اسید)، کاتیونی (بنزآلکونیوم کلراید)، آمفوتریک)
- ۲- الکل ها (اتانول و ایزوپروپانول) اسپوروسیدال نیستند (هرچه تعداد کربن الکل بالاتر باشد خاصیت میکروب کشی آن کمتر می شود).
- ۳- فلزات سنگین (جیوه، نقره، روی) که آنتی سپتیک هستند و سایر دزافکتان هستند.
- ۴- عوامل اکسید کننده شامل هالوژن ها، پراکسید هیدروژن، پراستیک اسید (استریل کردن قفسه حیوانات جرم فری)، ازون، گاز پلاسما که با تبدیل گروه سولفیدریل به شکل اکسید شده S-S خاصیت اکسیدکنندگی و تخریب DNA را دارند.
- ۵- عوامل آلکیل کننده شامل فرمالدئید، اکسیداتیلن (شایعترین استریل کننده گازی و کارسینوژن)، اکسید پروپیلن، و بتا پروپیولاکتون در اثر واکنش با گروه های سولفیدریل و هیدروکسیل پروتئین و اضافه کردن آلکیل به آنها اثر خود را اعمال می کنند.
- ✓ فرمالین، گلو تار آلدئید ۱/۱ درصد و بتا پروپیولاکتون در تهیه واکسن های غیرفعال ویروسی و باکتریایی استفاده می شوند.
- ✓ گلو تار آلدئید (استریل کننده سرد) جهت ضد عفونی دستگاه اندوسکوپی

ادامه

- ۶- فنل و ترکیبات فنلی (کرزول، لیزول، رزورسینول، اسید کربولیک، تری کلوزان) در صابون های دئودورانت وجود دارد و با اختلال در مسیر سنتز اسیدها چرب اثر خود را اعمال می کند
- ✓ بطور کلی تخریب غشا حاوی لیپید و اتصال غیرقابل برگشت به دهیدروژنازها و سیتوکرم اکسیدازهای متصل به غشا و اختلال در زنجیره انتقال الکترون) از عملکرد آنهاست.
- ✓ علیه مایکوباکتریوم ها اثر خوبی دارند.
- ✓ در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد اسپوروسیدال هستند.
- ✓ کلرهگزیدین در ضد عفونی کردن پوست و مخاط کاربرد دارد.
- ✓ ۷- رنگ ها (آنیلین مثل تری فنیل متان) (مهار فرایند اکسیداسیون سلولی) و آکریدین مثل پروفلاوین و آکروفلاوین (با ایجاد موتاسیون تغییر غالب و تاثیر روی نوکلئک اسید)
- ✓ ۸- اسیدها و قلیاها (اسید سولفوریک با اثر بر دیواره سلولی)، اسید بنزوئیک بعنوان نگهدارنده غذا و بازها مثل سود و آب آهک